

Lues le 20
Jbre 1770

N^o 3

Observation

Sur un étranglement de l'intestin
causé intérieurement par une bride du sac herniaire
suivi de quelques réflexions sur les faits
qu'elle présente.

Par M^r Boursquet, Médecin

Un homme âgé de cinquante ans portoit depuis son enfance deux
hernies inguinales, il avoit une si grande facilité à faire rentrer
les parties, lorsqu'elles sortoient, qu'il arrivoit très souvent, qu'il
y eût rarement usage du brayer. Le 4 Jbre 1770 celle du
côté droit se parut, le malade en fit la réduction comme
à l'ordinaire, quoiqu'il fut yvre; il s'appliqua le bandage, et
il ressentit aussitôt une douleur très aigüe aux environs de l'anneau.
Cette douleur s'étendit dans toute la région iliaque du même côté.
Le vomissement, le hoquet et tous les accidens de l'étranglement
survinrent en moins d'une heure; des remèdes généraux furent
employés inutilement, le malade mourut la nuit du 3
au 6 au bout de 56 heures.

A l'ouverture du bas ventre, j'appertus qu'une portion de l'intestin
ileon longue de deux pieds avoit passé avec le mésentère qui
lui est continu dans une bride dont l'extrémité antérieure
sembloit partir du bord supérieur de l'anneau et l'extrémité
postérieure se terminoit dans le sac. Le mésentère étoit si
distendu aux environs de cette bride, qu'il formoit un second
étranglement à la portion inférieure du même intestin.
Tous les visceres du bas ventre surtout l'intestin ileon étoient
très engorgés et fort rouges, et la portion comprimée dans la bride
étoit noire et livide.

Pour reconnaître la nature de cette bride, il eut fallu dévanger
les parties de la situation où elles étoient, et je crus devoir
m'assurer auparavant de la disposition du sac. Ayant
mis à découvert, la tunique vaginale du testicule me parut
très spacieuse, le testicule très sain y étoit comme suspendu
vers la partie supérieure. Je levais inférieurement et
par cette ouverture j'introduisis mon doigt jusqu'à

ARC 14
d. 28



+ Le 7. juv
1770.

La cavité du bas ventre, n'ayant trouvé aucun vestige de sa
particulière, je jugey que c'étoit une hernie de naissance.
Cette pièce me parut dès ce moment assez intéressante pour
devoir la présenter à l'Académie⁺. j'en fis la dissection
le lendemain en présence de M.^r Jodier qui avoit été
chargé de l'examiner, et de M.^r Brun et Dussau.
pour m'assurer de la nature de la bourse et de sa
position lorsque les parties étoient dans le sac,
j'aurois souhaité pouvoir les y faire retomber, mais
il ne fut pas possible, quoique j'eussent l'intestin
dont il sortit avec beaucoup d'air une grande
quantité de sang noir et fluide; le rapprochement
des membranes occasionné par un sang de même
nature, infusé dans leur substance et engorgement
du mésentère s'y opposerent. je fus obligé de
dégager les parties de l'anneau que formoit cette
bourse, ce qui fut aisé parcequ'elles n'y étoient point
adhérentes, quoique l'endroit de l'intestin et du
mésentère joints à cette bourse fut collé et ressemblé
comme si on l'avoit lié avec un fil. Les parties
étant dégagées, j'ay ramené cette bourse dans le sac
en tirant le testicule en bas. j'étois persuadé qu'elle
n'étoit pas formée par le cordon de vaisseaux ^{teins} spermatiques
comme plusieurs l'avoient presumé fonder sur ce qu'on
la voyoit lorsqu'on tiroit le testicule en bas, et
en effet je les ay trouvés comme ils sont toujours,
envelopés de leur ténue cellulaire et séparés du sac
au moyen d'une membrane assez mince qui en faisoit
la paroi postérieure. j'ay ouvert par en haut et
par en bas cette cavité pour voir la position
de cette bourse, elle étoit située vers la partie
moyenne, et se portoit obliquement de devant en
arrière et de la partie externe à l'interne.

elle avoit deux lignes d'épaisseur, un pouce environ de longueur et étoit de la même nature que celles qu'on trouve après l'écoulement dans les sacs herniaires, il peut se faire que la compression des bandages y ait donné lieu, Cet homme, avant de se retirer à l'hôpital, aura été exposé à porter des bruyers mal faits, ces sortes de bandages compriment irrégulièrement, mutilant les parties et occasionnent des adhérences qui avec le temps deviennent très dures et difficiles à détruire. Les parties en tombant dans le sac devoient nécessairement se dilater, cette dilatation tendoit à détruire le point d'adhérence, mais comme elle étoit forte elle n'a fait que porter et il a peu en résultat cette bride. Il est très vraisemblable que depuis son existence, les parties étoient tombées dans le sac, mais dans la réduction elles avoient toujours repris le même chemin qu'elles avoient tenu en tombant. Cette dernière fois elles avoient passé par dessous la bride, et elles ont été raménées par dessus, de façon qu'il a peu en résultat l'anneau, telle que nous l'avons trouvée. La compression du bandage qu'il fut appliqué immédiatement après, a peu alléger les accidens graves qui sont survenus si promptement, et s'est opposée à la rentrée si salutaire des parties dans le sac, si il est possible de presumer qu'elle eût peu avoir lieu sans cet obstacle.

J'ai examiné avec le même soin la hernie inguinale du côté gauche, il s'est présentée sous les tegumens un sac qui s'étendoit depuis le testicule jusqu'au pubis, il y avoit peu d'eau dans ce sac quoiqu'il pût contenir au moins un demi-septier, il étoit divisé en deux cavités séparées par une cloison située vers la partie inférieure. Je l'ai fondue dans toute sa longueur, la tunique vaginale du testicule en formant le plancher, et étoit plus mince et plus amoie qu'elle n'est naturellement



je l'ay ouverte, & le testicule nous a paru sain & nous avons apperçu a la partie Supérieure de cette Cavité un conduit d'environ trois lignes de diamètre qui alloit se terminer a un petit sac situé au-dessus de l'anneau. L'ouverture de ce conduit nous a laissé entrevoir des vaisseaux spermatiques placés derrière la membrane qui en formoit la paroi postérieure. au Côté interne de ce conduit étoit le sac herniaire adhérant aux parties circonvoisines & qui ne différoit en rien des sacs herniaires ordinaires.

il m'a paru que l'on pourroit tirer de cette observation plusieurs conséquences utiles a la théorie & a la pratique des hernies, & qu'elle présenteroit en même temps plusieurs faits relatifs aux hydrocèles.

il y a dans les mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie plusieurs observations sur les étranglements intérieurs, on en trouve beaucoup dans différents auteurs sur le même sujet, sans parler de ces étranglements qu'on dit pouvoir être occasionnés par la rentrée du sac herniaire lorsqu'il se trouve renversé dans quelques points.

il est certain qu'il a été impossible de porter un secours efficace au plus grand nombre. La passion chaque peut être occasionnée, comme le dit M^r hévin, par des causes bien différentes dont la plus grande partie est hors du domaine de la chirurgie opératoire. Les remèdes généraux ont été le seul moyen qu'on ait peu employer parce que les signes n'étant pas assez positifs, ils ne déterminoient ni la nature ni le lieu précis de la cause de ces étranglements. toute opération a été téméraire. mais il est certain aussi qu'une main hardie auroit sauvé la vie de plusieurs de ces infortunés. L'observation de M^r Braillet insérée dans le mémoire sur

La gastrotomie par M.^r Levin en est une preuve.
 M.^r de Lapeyronie dans celle qu'il a donnée sur
 l'étranglement cause intérieurement par l'adhérence
 de l'epigloon au dessus de l'anneau, rapporte que
 si le malade n'avait pas été dans un si déplorable
 état ^{si l'on n'avait eu l'idée d'une opération} il serait donc utile de recueillir des faits bien
 détaillés qui pussent déterminer les cas, ou le chirurgien
 pût avec sûreté recourir à l'opération dans la passion
 iliaque.

Les accidents qu'a éprouvés le malade qui fait le sujet de
 notre observation, ne laissent aucun doute sur
 l'étranglement et sur le lieu qu'il occupoit. il
 a senti immédiatement après la réduction aux environs
 de l'anneau une douleur très aigue qui s'est étendue
 par degrés dans toute la région iliaque; cette partie
 étoit si douloureuse qu'il n'étoit pas possible d'y
 toucher, le lieu étoit donc bien déterminé, il
 n'en étoit pas de même pour la nature de la cause.
 Cependant en considérant la vivacité et la promptitude
 avec laquelle les accidents se sont manifestés après
 la réduction, tandis qu'il ne souffroit pas lors
 même que les parties étoient hors de la cavité du
 bas ventre, il paroîtroit très vraisemblable
 que c'étoit un étranglement, une bride, une
 cause quelconque qu'on pourroit espérer de détruire
 par l'opération. L'indication étoit bien
 positive, mais je ne la vois pas aussi urgente.
 j'ay eu pourvoir attendre au lendemain pour
 me procurer le conseil de M.^r Brun chirurgien
 en chef de l'hôpital général et le malade
 est mort pendant la nuit.

j'avois tout lieu d'être persuadé que je trouverois
 la cause de l'étranglement aux environs de l'anneau.



mais quand bien même elle en aurait été éloignée
de trois poudres, je ne devois pas craindre qu'il
me fût impossible de l'enlever; j'avois pour devien
moy un exemple récent capable de m'ôter toute
crainte à ce sujet. au mois de Jbre 1769 j'e
fis d'opération du brubonocle, quoique les parties
fussent bien a delourer, l'anneau bien debrié
il ne me fût pas possible de les faire rentrer.
Le malade étoit toujours dans un état de souffrance.
je portay plusieurs fois mon doigt dans la cavité
du bas ventre aux environs de l'anneau, sans rien
trouver qui pût suggérer a la réduction; ne
voyant d'ailleurs d'ailleurs aucune cause extérieurement
je soupçonnay avec raison que l'obstacle venoit de
quelque adhérence ou de quelque bride intérieure
située plus profondément. j'introduisis de nouveau
mon doigt aussi avant qu'il me fût possible, et
je sentis a 3 poudres au moins de l'anneau une
bride fort dure; l'éloignement ne me permit
pas de l'examiner après pour pouvoir en faire
la description; je portay des ciseaux mouillés
le long de mon doigt et je la coupay fort aisément.
a peine avois je retiré mon instrument que les
parties rentrèrent d'elles mêmes dans la cavité
du bas ventre. Des le moment le malade s'en bien
trouvé, il n'a pas tardé d'aller a la selle, tous
les allieurs ont disparus et il a très bien guéri. j'ay
fait cette opération en présence de M^r Brun
et de M^r Martin chirurgien de la Salpêtrière
qui ont été témoins de son succès.

L'état de souffrance ou étoit le malade avant
de couper cette bride, quoique l'anneau fût
bien dilaté me fait presumer qu'elle aurait

4
peu entretenir les accidents et rendre l'opération
infructueuse. quand elle n'aurait même fait que s'opposer
à la rentrée des parties, il étoit bien avantageux de l'avoir
détruite, ce n'est pas une chose indifférente quoy qu'on ait
fait cesser l'étranglement que les intestins restent hors
de la cavité du ventre, les suites de l'opération en
sont sans contredit plus fâcheuses, l'événement plus
incertain. il est cependant des cas où il seroit dangereux
de s'obstiner à vouloir faire rentrer des parties promptement
j'ay été témoin d'un fait qui prouve le mauvais succès
de cette pratique, M^r Louis en donne la raison dans
son mémoire sur l'opération de la hernie, et fait
observer à ce sujet combien le chirurgien doit être
attentif à étudier les actions de la nature afin de
ne rien entreprendre ^{contre} son gré.

j'ay dit que des accidents qui avoient éprouvé de malade
qui fait le sujet de sa 1^{re} observation, devoient faire
supposer qu'ils étoient occasionnés par un étranglement,
une bride, une cause quelconque qu'on pouvoit espérer
de détruire par l'opération, par lequ'en même temps
il y avoit aux environs de l'anneau une douleur très
aiguë, fixe et déterminée qui marquoit le lieu précis
de l'étranglement. Cette dernière circonstance est
absolument nécessaire pour se déterminer à l'opération
en effet il peut arriver qu'après la réduction ^{par la taxis} d'une
hernie avec étranglement, les accidents, au lieu de
diminuer, augmentent avec la plus grande vivacité et
qu'ils soient produits par des causes qui sont hors du
domaine de la chirurgie opératoire. j'ay à ce sujet
une observation dont le détail devient intéressant
en ce qu'elle semble prouver en même temps, que
non seulement il peut arriver un étranglement
inflammatoire aux hernies dont la disposition



des parties seules ne les rendre susceptibles que d'un étranglement par engorgement, mais qui peut se faire encore que les altérés dans cet état inflammatoire sans être ni plus violents ni plus rapides que dans le cas d'engorgement, occasionneront néanmoins la mort aussi promptement que s'ils s'éloient d'abord manifestés avec la plus grande vivacité.

un homme âgé de 58 ans étoit incommodé depuis très long-temps d'une hernie complète. il avoit toujours été fort négligent à porter son bandage. les parties qui la formoient étoient presque toujours hors de la Cavité du ventre; quoiqu'elle hernie fut d'un volume assez considérable, elle ne l'empêchoit point de travailler il étoit le maître de son métier. il lui arrivoit de temps en temps d'éprouver de légers symptômes d'étranglement occasionnés vraisemblablement par l'engorgement des matières, mais il étoit ^{en} quelle pour garder le lit et faire diète, ou moins de deux jours il étoit soulagé la hernie rentrait totalement. Le 22 ^{bre} 1769 il se trouva dans le même cas, comme il y étoit accoutumé il n'appela du Secours que le lendemain 24 heures après et lors qu'il vit que les évacuations par les selles n'avoient pas produit le bon effet qu'il en avoit toujours retiré. je trouvoy la tumeur un peu dure et indolente, la couleur de la peau qui la recouvroit étoit dans son état naturel, le ventre étoit un peu distendu sans tension ni douleur, le malade avoit très peu de fièvre, il avoit déjà vomé deux fois quoiqu'il n'eût pris qu'un bouillon depuis 24 heures, et il sentoit des envies d'aller à la selle sans pouvoir s'en rendre. je tentay inutilement la réduction. on lui donna un lavement p^gnt qu'il rendit presque aussitôt. Les tentatives furent vaines sans succès. quoiqu'il la fièvre fut légère je le fis saigner et on appliqua

sur la tumeur un cataplasme emollient, et on
 fit en même temps des embrocations avec d'huile
 Royal sur le bas ventre. il prit pendant la
 nuit d'heure en heure un verre de dissolution
 de sel de pour un'once par pinte d'eau, il vomit
 encore deux fois d'ailleurs il fut assez tranquille le
 lendemain 24 je trouvoy les choses dans le même
 état que la veille, quoiqu'il eût pris plus d'une pinte
 de cette dissolution, il n'y avoit eu aucune évacuation
 par les selles et il sentoit des épreintes très vives. —
 je fis de nouvelles tentatives qui ne furent pas plus
 heureuses. il fut saigné pour la seconde fois et
 on vint avec le même lavement avec du calomel
 et le petit lait. a midy la position étoit
 la même, avec vomissements plus qui devenoient
 fréquents je crus une 3^e saignée nécessaire.
 Le soir je le vis avec M^r. Bruen, il fut décidé
 qu'il seroit saigné pour la 4^e fois et qu'on
 luy continueroit la dissolution de sel de pour.
 La nuit ne fut pas aussi tranquille que la précédente
 il vomit à plusieurs reprises et avec des efforts
 considérables des matières bilieuses, et on ne peut
 luy faire prendre qu'un verre de boisson.
 Le lendemain 25 je trouvoy le ventre légèrement
 tendu la fièvre avoit augmenté, la tumeur n'étoit
 plus indolente il ny avoit cependant aucun changem^{ent}
 à la couleur de la peau. on luy fit une 5^e saignée,
 je travaillay encore inutilement à la réduction.
 je le vis a midy, il étoit tourmenté par le
 hoquet depuis deux heures. je voulus faire les
 dernières tentatives, décide a en venir a l'opération
 si elles étoient également infructueuses. je fus
 étonné de la facilité que je trouvoy a faire
 la réduction, immédiatement après le malade



Demandas à aller à la selle; il rendit des matières
glaiseuses en très petite quantité. au bout d'une
dixième heure on vint m'avertir qu'il n'avait pas pu
relativer le soulagement que je lui avais fait préparer
et qu'il n'avait jamais tant souffert, effectivement
je trouvai le ventre fort tendu très douloureux
dans toute son étendue, des vomissements et le
hoquet étaient pour ainsi dire continus, il res-
semblait une bête ardente sans pouvoir rien
prendre, il était continuellement agité, son
pouls était petit serré et concentré il fut pendant
4 heures dans ce déplorable état souffrant les
douleurs les plus aiguës, sur les 5 heures il tomba
dans l'assoupissement, perdit connaissance et mourut
deux heures après.

Je fis l'ouverture du cadavre le lendemain
de grand matin. quoique l'épiploon n'eût pas
fait partie de la hernie, les vaisseaux étaient
très engorgés, le ventricule et tous les intestins
étaient rouges et enflammés. La portion de
Silion qui avait formé la tumeur herniaire
était livide noirâtre et contenait une liqueur
sanguinolente et fétide. quoique l'anneau
fut assez grand pour y passer aisément le
pouce, la partie de l'intestin qui y avait
respondu avait ^{été} comprimée qu'elle était
dure et calleuse, sans cependant que sa
cavité en fut probablement rétrécie. je ne
trouvai d'ailleurs, malgré les recherches
les plus exactes, ni bride ni adhérence,
aucun dérangement auquel je puisse attribuer
les troubles qui avaient suivi depuis la
réduction, aussi je n'avais pas remarqué
comme dans le malade qui fait le sujet

de la 1^{re} observation une douleur fixe -
plus aigue dans une partie du ventre que dans
toute autre, cette passion ilaque étoit donc du nombre
de celles qui sont hors du domaine de la chirurgie
opératoire.

je ne crois pas devoir m'en prendre aux devaniers &
tentatives, les parties sont rentrées aisément sans
effort de ma part, cependant le malade avant
la réduction n'étoit certainement pas dans un état
aussi fâcheux que plusieurs, à qui j'ai fait l'opération
ou réduit les parties par le taxis, avec le plus grand
succès.

un homme d'environ 65 ans étoit incommodé d'une
hernie qu'il avoit toujours eu besoin de contenir par
un bandage. ayant fait un effort dans un moment
où il ne savoit pas sa hernie sortit. Bientôt les accidents
se manifestèrent avec vivacité. malgré les secours le
plus prompt il ne fut pas possible de la faire rentrer.
Le 3^e jour je crus l'opération absolument
nécessaire, je fis prier M. Brown de venir
m'aider de ses conseils il fut de mon avis, le
malade s'y opposa constamment. Le 4^e jour
il étoit dans l'état le plus fâcheux, le ventre étoit
tendu et très douloureux, on remarquoit des plaques
rouges sur la peau qui recouvroit la tumeur je
ne pus cependant pas le déterminer à l'opération
il fallut s'en tenir à ~~fin~~ travailler à la réduction
par le taxis. les nouvelles tentatives réussirent. Le
malade après la réduction se trouva ^{très bien} ~~très bien~~
et au 4^e jour il fut hors d'affaire.



Examen le plus exact nous ayant convaincu que les parties,
qui forment la hernie du côté droit, dans la, en
observation, n'avoient jamais eu d'autre sac que la
tunique vaginale du cordon et des testicules, il étoit
incontestable que c'étoit une hernie de naissance.
il ne paroit pas que nous ayons beaucoup d'observateurs
en faveur de cette espèce de hernie, il y en a
pependant un grand nombre qui examinées
attentivement ne permettent pas de la renvoyer
en doute. on n'a presque pas écrit sur les hernies,
sans faire remarquer qu'on a trouvé plusieurs fois
des viscéres sortis de la cavité du bas ventre renfermés
dans un même sac avec le testicule. il faut que cet
garment d'ait observé bien souvent, puis qu'il divise
les hernies complètes, en celles où l'intestin est séparé
du testicule et en celles où ils sont joints et mêlés.

pour expliquer cette dernière circonstance, on a eu recours,
on à la rupture du sac herniaire et de la tunique
vaginale, On à un vice de conformation. il est certain
que cet état des parties dans l'adulte exclut absolument
tout autre moyen d'en rendre raison, mais il n'en est
pas moins vrai que cette rupture a été supposée
généralement. pour s'en convaincre il suffit de
chercher la cause qui pourroit y donner lieu.
alléguant on le poids des parties qui forment
la hernie, la distension du sac par le volume
de ces parties. mais on voit tous les jours dans
des hernies monstrueuses de sac et de plus épais
plus fort que dans des petites hernies, et on
supposant même la rupture du sac possible par
une de ces causes, il faut encore en trouver une
pour celle de la tunique vaginale, on admettra
une adhérence si intime entre les deux membranes
que la rupture de l'une entraîne nécessairement
celle de l'autre.

je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une certaine
quantité d'eau altérée dans la tunique vaginale
et dans le sac herniaire puissent les enlever
des adhérences au point qu'elles ne restent pas,
puisque on trouve au contraire dans des hydrocèles
la tunique vaginale plus épaisse plus forte. avant
ou même à l'inflammation, mais son effet le
plus ordinaire est de rendre les membranes collées;
il faudroit supposer qu'elles tombent en foute
et qu'il ne se forme rien survenant-il pas? il
en résulteroit au moins des adhérences et on
trouve cependant l'intestin de Crispin et le testicule
renfermés dans le même sac sans qu'il y en ait
aucune non seulement entre eux mais même
au sac devenu commun, sans aucune lésion
quelconque. il paroit d'ailleurs très vraisemblable
que cette rupture ne seroit pas toujours arrivée
dans le même endroit qu'elle ne le seroit pas
toujours faite de même et les auteurs en auroient
détéminé des différences.

Ce n'est pas non plus un vice de conformation
mais on a été forcé de recourir à ces suppositions
parce qu'on ne peut pas considérer la disposition primitive
des parties. on trouve assés constamment jusqu'à 3 mois
des testicules dans le ventre, ils n'ont pas encore de
tunique vaginale, on ne remarque que l'abdomen
qui n'est autre chose qu'une production du péritoine
dont le plexus de vaisseaux qui forme le corps du
testicule se trouve recouvert et enveloppé comme
la plus part des viscères du bas ventre. ils sortent
en suite de cette cavité, passent par les anneaux
et vont se loger dans le scrotum. il est évident
qu'ils ne peuvent y descendre sans entraîner

une portion du péritoine qui, en les recouvrant, forme
leur tunique vaginale. Cette production membraneuse
du péritoine est faite en forme de doigt de gant, dont
la cavité est une continuation de celle de l'abdomen.
C'est alors ou d'on peut dire qu'il existe réellement
une tunique vaginale de long du cordon des vaisseaux
spermaticques, mais les vaisseaux sont hors de la
cavité, enveloppés dans une tulle cellulaire qui est une
production de celui qui environne le péritoine. Cette
cavité est vaine et n'est autre chose que celle du testicule
qui se continue avec celle de l'abdomen. C'est là
où peuvent se glisser les viscères du bas ventre
lorsqu'il se trouve des causes déterminantes, et lorsque
cela arrive, il est évident qu'ils doivent se trouver
près et mêlés avec le testicule.

On trouve de plus ordinairement cette tunique vaginale
obstruée depuis l'abdomen jusqu'aux dessus des testicules
peu de temps après la chute de ces organes, dans le
scrotum; mais si il arrive qu'il s'y accumule du sang,
ou qu'il se glisse quelques viscères et qu'on n'ait pas
le soin de les faire rentrer exactement et de les bien
contenir, il est impossible qu'elle s'obstine et elle devient
un sac herniaire. C'est qui est arrivé à l'homme qui
fait le sujet de ces observations. Ce n'est pas la
seule fois que j'ay fait cette remarque. J'ay trouvé
à l'ouverture du cadavre d'un homme mort à l'âge
de 27 ans le testicule exactement enveloppé par
une portion de péritoine, cet homme se voit approuver
des son enfance qu'il avoit le testicule droit plus
volumineux que le gauche. quoiqu'il ne souffrit
pas, il avoit consulté plusieurs chirurgiens sur cette
inégalité: on n'avoit jamais soupçonné de hernie
et on s'avoit toujours tranquillisé au long défaut

qu'il arrivoit trop souvent que l'on avoit une testicule
plus gros que l'autre. je ne ~~peux~~ faire voyer pas le
détail de cette observation, quoiqu'elle soit intéressante
j'en feray usage dans une autre occasion

M^r Morgagni croit qu'on peut être induit en erreur,
en croyant que la tunique vaginale du testicule est
adhérente au sac herniaire et au testicule lui-
même, mais on peut faire faillie dans le sac,
de façon à faire croire qu'il est plus étendu
avec les viscères. il est bien certain que je ne l'ay
pas été, que Dupuytren touchoit exactement la
tunique albuginée et qu'il étoit recouvert avec
la testicule de la tunique vaginale. quoiqu'il
grand observateur ne pense pas que les viscères
puissent se glisser dans la tunique vaginale, malgré
l'assertion de Boerhaave qu'il cite lequel j'ai vu
plusieurs fois le fait, et l'observation de M^r Morgagni
insérée dans les mémoires de l'Académie des Sciences;
il en rapporte cependant plusieurs où il y avoit que
les parties n'avoient jamais eu d'autre sac. Entre
autres, il y en a deux assez remarquables la 1^{re}
dans la 21^{me} Lettre paragraphe 15 la 2^{de} dans
la 34^{me} paragr. 9.

presque tous les auteurs enseignent qu'on ne peut guères
espérer d'obtenir par la compression une cure radicale des
hernies que dans l'enfance, encore faut-il, selon
quelques uns, qu'elles ne soient pas de naissance. Il
peut cependant résulter de la disposition de la
tunique vaginale à s'oblitérer promptement que la
cure de ces dernières doit être aussi facile à obtenir que
si les parties étoient contenues dans un sac herniaire
ordinaire. j'ay même une observation que j'auray
l'honneur de lire dans un moment qui semble



prover qu'elles peuvent guérir en moins de temps. —

il vult maintenant examiner en quoy cette première observation peut être utile à l'histoire de l'hydovèle, il faut de se rappeler les faits qu'elle présente, pour en être convaincu. non seulement elle prouve la possibilité, mais elle détermine le vrai siège de cette espèce d'hydovèle par épanchement, sur laquelle les auteurs ont pensé si différemment. je veux parler de l'hydovèle de la tunique vaginale du cordon des vaisseaux spermatiques. elle prouve aussi qu'il peut y avoir des hydovèles par épanchement très considérables hors de la tunique vaginale.

parmy les auteurs qui ont écrit de cette maladie, les uns disent qu'il peut se former une hydovèle enkystée dans la tunique vaginale du cordon. d'autres l'admettent mais ils la placent dans le tissu cellulaire qui enveloppe les vaisseaux spermatiques; ils pensent que le sang accumulé dans ces cellules peut avec le temps par son poids ou son abondance détruire la cloison qui sépare ^(cavité de la) la tunique vaginale du cordon de celle du testicule et qu'alors ces deux cavités n'en font plus qu'une — il semble que cette partie n'a pas été exactement vue ni par les uns ni par les autres. Ceux qui disent cette espèce d'hydovèle par épanchement, n'ont vraisemblablement considéré la disposition anatomique des parties qu'après oblitération de la tunique vaginale. il est évident qu'il ne parait pas alors qu'il puisse se former d'épanchement, on ne remarque aucune cavité comme le dit fort bien M. Desvrandi nullum certe cavum, quemadmodum nonnulli opinati sunt, in hac spermatibili funiculi vaginali tunica naturaliter institutum observatur.

il n'y en a certainement aucune. Lorsque la tunique vaginale est oblitérée jusqu'au dessus des testicules dans toute son étendue, mais elle ne s'oblitére pas toujours parfaitement. nous en avons trouvé dans l'homme qui fait le sujet de la présente observation que l'extrémité supérieure bouchée, elle reste même quelque fois dans son état primitif M^r Duffau & a souvent remarqué dans des enfants, il les trouve entièrement ouverte Sur un enfant mort à l'âge de 7 ans; il est aisé de faire passer une grosse sonde de la cavité du bas ventre dans la tunique vaginale du testicule, quoique celui cy parut être dans le scrotum depuis long-temps et qu'il n'y eut aucun indice qu'il s'y fût jamais glissé aucun viscère. j'ay observé il y a environ 3 ans Sur un enfant de la pitié de 15 à 16 ans une tumeur au dessus du testicule droit; elle s'étendait jusqu'à l'anneau, on y sentait une fluctuation très manifeste, et toutes les fois que je la pressais du côté du bas ventre, elle disparaissait aussitôt totalement. après l'avoir bien vuider j'y appliquay une brasse qui comprime exactement. cet enfant fut obligé de garder le lit pendant un mois pour un coup qu'il avoit reçu à une jambe. au bout de ce temps la je l'examinay. je le fis marcher et tousser cette tumeur ne reparut pas et n'a plus reparu. elle s'étoit manifestée, il y a eu environ 4 mois, quelque temps après la sortie du testicule de la cavité du ventre. il est incontestable que c'est du sang amassé dans la tunique vaginale qui n'est encore oblitérée que dans une certaine étendue au dessus du testicule et il seroit peut être arrivé, si elle y avoit séjourné plus long-temps, que la tunique vaginale étoit bien relâchée se seroit ouverte & le sang seroit tombé dans la cavité vaginale du testicule.



J'ay trouvé plusieurs fois même dans l'adulte une cavité de 3 à 4 lignes de profondeur, située dans la cavité du bas ventre vis à vis l'anneau qui m'a paru être l'embochure de la cavité vaginale primitive puisqu'il est vrai d'après les observations que je viens de rapporter que la tunique vaginale se bouche seulement tantôt du côté du ventre, tantôt du côté du testicule, ne peut il pas arriver qu'elle soit bouchée à ses deux extrémités, qu'elle conservera sa cavité dans l'intervalle et qu'il pourra s'y faire une collection d'eau également comme dans la tunique vaginale du testicule. La structure est la même les deux cavités sont seulement séparées par un rétrécissement une oblitération arrive dans une poche de la tunique vaginale, il me semble que cette dernière considération auroit fait penser en s'y réfléchissant, car une des principales raisons qu'il donne pour rejeter l'hydrocèle de la tunique vaginale du cordon, c'est qu'il n'y voit pas de cavité ou la nature ait assigné un convenable tissu de vaisseaux pour la sécrétion d'un fluide, comme dans la tunique vaginale des testicules.

C'est là le véritable siège de l'hydrocèle par épanchement de la tunique vaginale du cordon des vaisseaux ^{ou par épanchement} et non dans le tissu cellulaire qui accompagne les vaisseaux il est cependant vrai qu'il peut s'y former une certaine collection d'eau, mais ce ne sera qu'au moyen d'un kiste accidentel, comme il peut arriver par tout ailleurs. Le tissu cellulaire qui accompagne les vaisseaux est une production du tissu cellulaire du péricrâne, il n'en diffère que parce qu'il est moins grasseux il est évident que l'eau contenue dans le kiste est entièrement hors de la tunique vaginale et qu'il parait impossible qu'elle puisse tomber de ce sac dans la tunique

vaginale des tumeurs; je suis persuadé que toutes les fois qu'on a fait cette remarque, le fluide est véritablement dans la tunique vaginale et non dans un kist formé dans le tissu cellulaire presque tous les auteurs nient l'existence de l'hydovèle existant hors de la tunique vaginale. Soit que le fluide s'amasse au dehors du dartos et même du crémaster, elle doit, disent ils, s'infiltre dans le tissu cellulaire, former simplement un œdème. C'est à dire une hydovèle par infiltration et jamais par épanchement. il est cependant vrai que cette espèce d'hydovèle peut avoir lieu, outre celle que j'ai trouvée dans le sujet de la 1^{re} observation j'en ay rencontrée plusieurs autres. Les praticiens d'ailleurs, qui s'admettent, ont vu très probablement des observations qui les ont autorisés à établir cette doctrine, et on ne peut pas croire avec eux sans que les descriptions qu'en on a fait depuis celle soient autant de copies de cet original. quoique dans l'état physiologique le dartos ne parait pas propre à former un sac capable de contenir du fluide de façon qu'elle ne s'infiltre pas dans le tissu cellulaire qui l'environne il peut l'être dans l'état pathologique: la quantité du fluide peut changer sa structure on peut raisonner de même à l'égard du crémaster, mais d'ailleurs celui ^{considéré} dans l'état naturel, parait propre à former un sac entre lui et la tunique vaginale de façon que le fluide, qui y sera contenu, ne puisse pas s'infiltre dans le tissu cellulaire du scrotum j'ay préparé très souvent le muscle avec soin et j'ay toujours trouvé qu'il se terminoit par une large aponeurose qui recouvre la tunique vaginale



et la fortifie, en effet lorsqu'on a eutere cette
membrane aponeurotique, on trouve la tunique
vaginale du testicule, faite d'une membrane tres
mince semblable au peritonee dont elle est une
production. C'est entre la tunique vaginale et
l'aponeurose du cremaster que nous a paru
etre situe l'hydovcle enkiste que nous avons
trouve dans le sujet de la, en observation
mais sans avoir egard a ces muscles, il est certain
qu'il peut se former dans le tissu cellulaire qui
les environne une hydovcle enkiste, tout comme
dans le tissu cellulaire qui accompagne et enveloppe
les vaisseaux spermatiques on en a rencontre plusieurs
fois des collections d'eau enkistes. il n'y a pas entre
eux de differences assez essentielles pour qu'ils
puissent avoir lieu dans l'un et non dans
l'autre

Le 20 Fev 1770

Bousquet Chirurgien
de l'Hopital



N° 3.